

人血白蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语:本品为人血液制品,尽管经过筛检及灭活病毒处理,仍不能完全排除含有病毒及其他病原体引起血源性疾病传播的可能。

【药品名称】

通用名称:人血白蛋白

英文名称:Human Albumin

汉语拼音:Renxue Baidanbai

【成份】

人血白蛋白,本品系由健康人血浆经低温乙醇沉淀法分离纯化,并经60°C、30分钟加热灭活后加稳定剂,不含防腐剂和抗生素。

【性状】

本品为略黏稠、黄色或绿色至棕色澄明液体,不应出现浑浊。

【适应症】

1. 失血创伤、烧伤引起的休克。
2. 脑水肿及损伤引起的颅压升高。
3. 肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。
4. 低蛋白血症的防治。
5. 新生儿高胆红素血症。
6. 用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征。

【规格】

10g/瓶(20%, 50ml)

【用法用量】

用法:一般采用静脉滴注或静脉推注。为防止大量注射时机体组织脱水,可采用5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液适当稀释作静脉滴注(宜用带有滤网装置的输血器)。滴注速度应以每分钟不超过20滴为宜,每次注射500ml,滴注速度应逐渐加速至上述速度。

用量:使用剂量由医师酌情考虑,一般因严重烧伤或失血等所致休克,可直接注射本品5~10g,隔4~6小时重复注射1次。在治疗肾病及肝硬化等慢性白蛋白缺乏症时,可每日注射本品5~10g,直至水肿消失,血清白蛋白含量恢复正常为止。

【不良反应】

上市后监测到人血白蛋白注射剂的下列不良反应/事件:

全身性疾病及给药部位各种反应:发热、寒战、胸部不适、畏寒、虚弱、水肿、疼痛、腰痛、注射部位皮疹、注射部位肿胀、注射部位痛。

皮肤及皮下组织:皮疹、荨麻疹、斑丘疹、丘疹、红斑、水疱、瘙痒、多汗、皮肤肿胀、紫癜、血管性水肿。

呼吸系统:胸及咽喉呼吸困难、呼吸急促、面部和咽喉部不适、喉痛、呼吸短促。

胃肠系统:恶心、呕吐、腹泻、腹痛、腹胀、胃部不适、口腔感觉异常、消化道出血。

免疫系统:超敏反应、过敏反应、过敏反应、过敏性休克。

心脏器官:心悸、心动过速、心律失常、房颤、心动过缓、心力衰竭、心肌梗死。

神经系统:头晕、头痛、震颤、感觉减退、味觉障碍、嗜睡、昏迷、晕厥、意识丧失。

血管与淋巴管:潮红、发绀、苍白、四肢发冷、低血压、高血压、鞘膜炎。

精神类:烦躁不安、抽搐、精神障碍、意识模糊状态、失眠、焦虑。

肝胆系统:肝功能异常。

肾脏及泌尿系统:血尿、少尿、尿失禁、肾功能损害。

