

BIOHUI®

博晖生物

核准日期: 2006年03月02日

人免疫球蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

可能。临床使用时应权衡利弊。

传播的

【效

【药品全

通用名称: 人免疫球蛋白

【规格】

300mg/瓶 (10% 3ml)

【成份】

【用法用量】

主要成份为人免疫球蛋白。本品系由健康人血浆，经低温乙醇蛋白分离法与层析法分离纯化，并经低pH (pH4.0) 病毒灭活和DV50pH4 纳米膜过滤处理。

用法: 只限于肌肉注射, 不得用于静脉输注。

用量: 遵医嘱。

预防麻疹: 为预防发病或减轻症状, 可在与麻疹患者

接触后, 于3-5天内, 每2-3天肌肉注射0.5-0.75ml, 连续3次。

治疗: 成人每次肌肉注射1-2ml, 儿童每次肌肉注射0.5-1ml, 每日1次, 连续3-5天。

超过6ml。一次注射预防效果通常为2-4周。

【性状】

或淡黄色澄清液体, 可带乳光, 不得出现

【不良反应】

应为无色

尚待积累和完整不良反应的监测资料。少数人会出现

浑浊。

注射局部红肿、疼痛反应, 无需特殊处理, 可自行

【适应症】

【禁忌】

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细

IgA缺乏者

感染有一定的作用。
毒理研究尚不清楚。

2. 有IgA抗体的选择

【注意事项】

运输及贮存过程中严禁冻结。

【贮藏】

于2~8℃避光保存和运输。

妇及哺乳期妇女用药】

【包装】

专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

36个月

【田注田县】而

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

《中国药典》2025年版三部和YBS00252013

参考文献

【批准文号】

【药物相互作用】

国药准字S20063021：300mg/瓶

应单独使用。凡对免疫球蛋白有相互作用的药物可
能会对本品产生相互作用。

国药准字S20063020：150mg/瓶

【药品上市许可持有人】

【药物过量】

博晖生物制药(河北)有限公司

可能产生变异反应和因剂量大在注射部位造成疼
痛感。

【生产企业】

企业名称：博晖生物制药(河北

)有限公司

13-3393518

是把免疫球蛋白内含有的大量抗体输给受者，使之

电话：0

状态：由

从低或无免疫状态很快达到暂时免疫保护